



Dr Réjean Labrie, orthodontiste inc.

Élastiques Informations générales



Le succès d'un traitement orthodontique dépend principalement de deux facteurs: une pression constante et le temps.

Parfois, il faut plus de force pour amener les dents et les mâchoires à leur position normale. Les élastiques sont alors la solution et ils ne peuvent rien sans vous!

Pour obtenir un sourire sain et radieux, vous devez suivre attentivement nos recommandations.

Au début, le port des élastiques peut rendre vos dents sensibles. La raison est que les dents se déplacent et c'est notre objectif! Habituellement, cette sensibilité ne dure que quelques jours. Cependant, même avec cette sensibilité vous devez continuer à porter vos élastiques de la façon dont on vous l'a démontré. Ne pas porter les élastiques tel que prescrit ne fera qu'allonger cette période de sensibilité et prolonger considérablement la durée du traitement.

Recommandations

Pour obtenir les meilleurs résultats des élastiques, rappelez-vous:

- Vous êtes responsable de placer les élastiques sur vos boîtiers à chaque jour, à la fréquence qu'il vous a été prescrit et à la position que l'on vous a démontrée.
- Ayez toujours quelques élastiques avec vous, afin de les changer environ de 2 à 3 fois par jour ou s'ils brisent.
- S'il vous manque des élastiques, vous pouvez passer en chercher sur nos heures d'ouverture ou tout simplement appeler pour qu'on vous en poste à la maison. N'attendez pas votre prochain rendez-vous.

Urgence

Si vous avez quelque problème que ce soit, comme un poteau brisé ou un boitier décollé, appelez au bureau pour une visite. N'attendez pas votre prochain rendez-vous. Ces problèmes doivent être corrigés dans un bref délai. Entre-temps, cessez le port de vos élastiques.